



ورشة عمل

**Advanced life
support**



جامعة طنطا
كلية التمريض
وكالة الكلية لشئون البيئة وتنمية المجتمع
المركز التمريضي لخدمة المجتمع وتنمية البيئة (المشروع البحثي الطلابي)



اعلان

يعلن المركز التمريضي لخدمة المجتمع وتنمية البيئة (المشروع البحثي الطلابي)
لطلاب كلية التمريض بجميع الفرق الدراسية عن ورشة عمل

تحت عنوان


Advanced life Support

وذلك يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٥/١٧ الثانية عشر ظهرا في قاعة المؤتمرات
بالمبنى الجديد الدور الثاني علوى
ويحاضر فيها د. هناء الهينا مدرس تمريض الحالات الحرجة -كلية التمريض
جامعة طنطا

عميد الكلية
د. عفاف عبد العزيز

وكيل الكلية لشئون البيئة وتنمية المجتمع
د. أم إبراهيم الساعى

مستشار المشروع
د. ناهد كرم







جامعة طنطا

كلية التمريض



المركز التمريضي لخدمة المجتمع و تنمية البيئة (المشروع البحثي الطلابي)

تقرير عن الورشة التدريبية (Advanced life support)

القائم بالتدريب/ دكتور هناء البنا (مدرس بقسم تمريض الحالات الحرجة والطوارئ)

عدد المشاركين طلاب كلية التمريض بجميع الفرق وطلاب البرامج الخاصة/ 100 طالب

The question	Correct Answer	Incorrect Answer	Correct Answer	Incorrect Answer
1. The drug of choice for most forms of narrow-QRS tachycardia is:	20%	80%	99.0%	1.0%
2. Vasopressin may be used in the management of:	60%	40%	97.0%	3.0%
3. Which Of the following could be administered endotracheal if necessary	70%	30%	100.0%	0.0%
4. The most common side effects of giving amiodarone are:	39%	61%	95.0%	5.0%
5. A 75-year-old man has suffered a cardiac arrest. The arrest was not witnessed. CPR is in progress. The cardiac monitor reveals ventricular fibrillation. A monophasic waveform defibrillator is available to you. Your next action will be to:	75%	25%	98.0%	2.0%
6. Which Of the following approaches is recommended during an initial patient evaluation:	70.0%	30.0%	95.0%	

CS CamScanner



7. A 37-year-old woman is complaining of shortness of breath and palpitations. You have placed the patient on oxygen and an IV has been established. Her mental status is rapidly decreasing, and she is very pale. Her initial blood pressure was 148/70. It is now 62/38. Breathing is shallow at 8 to 12 breaths/minute. The cardiac monitor shows the following rhythm:	45.0%	55.0%	98.0%	2.0%
8. At doses recommended for use in cardiac arrest, epinephrine and vasopressin:	85.0%	15.0%	98.0%	2.0%
9. The first antiarrhythmic administered in the management of the patient in pulseless ventricular tachycardia or ventricular fibrillation is:	49.0%	51.0%	97.0%	3.0%
10. During cardiac arrest:	70.0%	30.0%	100.0%	0.0%

التعليق على النتائج

أوضحت النتائج ان الورشة التدريبية كان لها تأثير واضح على تحسين معلومات الطلاب قبل لقاء الورشة التدريبية و ازدادت معلومات الغالبية العظمى منهم بعد القائها.

عميد الكلية

د/ عفاف عبدالعزيز بصل

مستشار المشروع

ا.م.د/ ناهد كرم السحري

ناهد السحري